

I. DATOS DEL USUARIO/USUARIA

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Fecha de Nacimiento			Edad	Sexo
ARTEAGA	INTRIAGO	MARIANA DE JESUS	16	10	1945	79 años, 3 meses, 13 días	Mujer
			día	mes	año	a-m-d	1=H 2=M

Nacionalidad	País	Identificación	Lugar de residencia			Dirección	No Telefónico
ECUATORIANO/A	ECUADOR	0900211392	MANABI	CHONE	RICAUARTE	AV CARLOS ALBERTO ARAY y	095-991-0215 / (00)-000-0000
Ver instructivo	Describir País	Cédula 10 dígitos	Provincia	Cantón	Parroquia	Calle Principal y Secundaria	Conveccional/Celular

II. REFERENCIA ☒ DERIVACIÓN ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area
MSP	0900211392	RICAUARTE	CENTRO DE SALUD TIPO A	13D07 / ZONA 4

Refiere o Deriva a:					Fecha		
MSP	HOSPITAL GENERAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA	Consulta externa	Cirugía Ortopédica Y Traumatología		2025	01	29
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Servicio	Especialidad		día	mes	año

2. Motivo de la referencia o derivación:

Limitada capacidad resolutive	☒	Saturación capacidad instalada	☐
Ausencia temporal del profesional	☐	Otros/especifique:	☐
Falta de profesional	☐		

3. Resumen del cuadro clínico

PACIENTE QUE ACUDE POR PRESENTAR CUADRO CLINICO DE APROXIMADAMENTE 5 MESES DE EVOLUCION CARACTERIZADO POR DOLOR LUMBAR QUE LIMITA LA SEDESTACION Y LA DEAMBULACION ASI COMO LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA. SE REALIZA RADIOGRAFIA DONDE SE OBSERVA ESCOLIOSIS LUMBAR

4. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

RADIOLOGIA CONVENCIONAL : Rx ap y lateral de columna lumbar. Eje longitudinal muestra desviacion hacia la izquierda. Escoliosis. Angulo de Cobb, aumentado, mide 17.8 grados. Incremento de la lordosis lumbar fisiológica. Cuerpos vertebrales lumbares de numero y altura conservada. Pinzamiento de los espacios intervertebrales L3-L4 y L4-L5, asociados a aparente en la amplitud del agujero de conjunción. Disminución del espacio intervertebral de L5-S1, asociados a camios escleróticos. Amplitud del agujero de conjunción impresiona estar conservada. No se observan alteraciones en las estructuras que conforman el arco posterior. Partes blandas sin alteraciones aparentes. RADIOLOGIA CONVENCIONAL : RX AP DE PELVIS. Mineralización ósea disminuida. No se observan trazos de fractura y o fisura. Cambios degenerativos manifestados por cambios escleróticos de las superficies articulares y Osteofitos prominentes en cejas acetabulares superiores. Disminución leve y simétrica de los espacios articulares coxofemorales. Líneas de Shenton continuas. Partes blandas sin alteraciones.

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF
OTRAS FORMAS DE ESCOLIOSIS	M418		X

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2025-01-29	15:12	Medicina Familiar Y Comunitaria	ESTEFANIA ZORAYDA SAAVEDRA MOREIRA	1311538662	

III. CONTRAREFERENCIA ☐ REFERENCIA INVERSA ☐

1. Datos Institucionales

Entidad del Sistema	His.Clinica No.	Establecimiento de salud	Tipo	Servicio	Especialidad

Contrarefiere o Referencia inversa a:				Fecha		
			/			
Entidad del Sistema	Establecimiento de salud	Tipo	Distrito/Area	día	mes	año

2. Resumen del cuadro clínico

3. Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos diagnósticos

4. Tratamiento y procedimientos terapéuticos realizados

5. Diagnóstico

Diagnóstico	CIE-10	PRE	DEF

6. Tratamiento recomendado a seguir en le establecimiento de salud de menor nivel de atención y/o complejidad

FECHA	HORA	ESPECIALIDAD	NOMBRE DEL PROFESIONAL	CÓDIGO	FIRMA
2025-01-29	15:12	Medicina Familiar Y Comunitaria	ESTEFANIA ZORAYDA SAAVEDRA MOREIRA	1311538662	

